

کوئین میری ہاسپیٹ

جگر کی پیوند کاری کے بعد مریض کی نگہداشت
اور جگر کی پیوند کاری کے بعد کی
پیچیدگیوں کا تعارف

جگر کی پیوندکاری کے بعد
مریض کی نگہداشت



جگر کی پیوندکاری کے بعد عمومی معلومات

1) انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں

10 گھنٹے کے جگر کی پیوندکاری کے آپریشن کے بعد، آپ کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ (آئی سی یو) میں پیچیدہ انتظام کے لیے منتقل کر دیا جائے گا۔ جگر کی پیوندکاری پر مامور ٹیم کے معالجین آپ کے علاج کی دیکھ بھال جاری رکھیں گے۔

آپریشن کے بعد کے پہلے دو ایام انتہائی نازک ہوتے ہیں۔ آپ کو نگرانی کے بعض آلات، اخراجی نظام، شریان یا وینس کیتھیٹرز، یا وینٹی لیٹر وغیرہ سے منسلک کیا جائے گا۔ طبی عملہ نگرانی کے آلات کی مدد سے آپ کی حالت کا مشاہدہ کرے گا اندازہ قائم کرے گا۔ عام طور پر، آپ آئی سی یو میں 2-3 ایام یا اس سے زیادہ رہیں گے اور آپ کی نگرانی کی جائے گی۔ جب آپ کی حالت مستحکم ہو جائے گی تو، آپ کو مزید انتظام اور مشاہدے کے لیے لیور ٹرانسپلانت سنٹر میں منتقل کر دیا جائے گا۔ معالجین ہر روز آپ کی پیش رفت کی نگرانی کریں گے اور آپ کی منتقلی کا فیصلہ کریں گے۔

2) لیور ٹرانسپلانت سنٹر سے جنرل وارڈ میں واپسی

وارڈ میں قیام کے دوران، آپ کو طبی اور نرسنگ عملہ کے مشورے اور دینمائی کی پیروی کرنی چاہیے۔ بے چین اور پریشان نہ ہوں۔ خاندان اور دوستوں کی طرف سے معاونت اور حوصلہ افزائی آپ کی بحالی صحت میں کردار ادا کرے گے۔



لیور ٹرانسپلانت سنٹر

آپریشن کے بعد زخم میں درد کا انتظام

آپ کو آپریشن کے بعد وریدوں کے ذریعہ پیش نئے کنٹرول اینلجنسیا (PCA) دی جائے گی۔ پھر معالجین اور اینستھیسٹس بذریعہ منه یا انٹرامسکلر ادویات باقاعدگی سے تجویز کریں گے۔ آپ طبی اور نرسنگ عملے سے ادویات یا مزید معلومات کے متعلق پوچھ سکتے ہیں اگر ضرورت ہو۔

آپریشن کے بعد خون کا معائنه

پیوندکاری کے بعد، آپ کو ہر روز خون کے معائنه کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو نرسنگ عملے کی دی گئی ہدایات کی پیروی کرنی چاہیے اور خون نکالے جانے کے بعد FK506 یا سیروولیمس لینی چاہیے۔ معالجین دوا کے لیوں کو دوا کی خوراک بدلتے کے ذریعہ درست کریں گے اور آپ کی بحالی صحت کی پیش رفت کا معائنه کریں گے۔

آپریشن کے بعد غذا

آپریشن کے بعد، ڈاکٹر آپ کو مناسب غذائیت کے حصول کے لیے جلد از جلد باقاعدہ خوراک دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ دیں گے۔ جب آپ پہلی بار خوراک دوبارہ شروع کریں گے تو، آپ کو بھوک میں کمی، متلى، پیٹ پھولنا، یا یہاں تک کہ قے کا سامنا کرنا ہو گا۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ سرجری کے بعد اینستھیزیا اور آنتوں کی سست حرکت کے باقایا اثرات موجود ہوتے ہیں۔ آپ چند ایام میں ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی بھوک آہستہ آہستہ بہتر ہو جائے گی۔ ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ باقاعدگی سے کھانے کی مقدار کم کریں اور باقاعدہ کھانوں کے درمیان کھائیں۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور کھانے سے پہلے اور بعد میں بہت زیادہ مائع لینے سے گریز کریں۔ نرس آپ کے لیے صاف خوراک اور پینے کے پانی کا انتظام کرے گی، تصویر 1 دیکھیں، لہذا خاندان کو آپ کے لیے کھانا

لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غذائی ماہرین بھی آپ کو ملاحظہ کریں گے اور آپریشن کے بعد کھانے کا پلان تیار کریں گے۔



عکس 1: جگر کی پیوند کاری کے بعد صاف غذا اور پانی

بعد از آپریشن نگہداشت اور ورزش

مناسب غذائیت حاصل کرنے اور مخصوص اوقات میں ادویات لینے کے علاوہ، صحت یابی کے لیے ہلکی ورزش ضروری ہے۔ سرجری کے بعد پہلے چند ایام میں، آپ کو بستر سے اٹھنا چاہیے اور روزانہ کم از کم 1-2 گھنٹے کے لیے کرسی پر بیٹھنا چاہیے۔ براہ مہربانی مزید گھری سانس لینے کی ورزش کریں کیونکہ اس سے آپ کے پھیپھڑوں کو پھیلنے میں مدد ملتی ہے اور آپ کو بلغم کو آسانی سے بذریعہ کھانسی باہر نکالنے کے قابل بناتا ہے یا سانس لینے کے لیے اپنا خرید کردہ بریدنگ ایکسرسائزر کا استعمال کریں (عکس 2 دیکھیں)۔



عکس 2: بریدنگ ایکسرسائزر

علاوه ازین، فزیو تھریپسٹ آپ کو سائیکل کے ذریعہ ٹانگوں کی ورزش کرنا سکھائے گا، عکس 3 دیکھیں، تاکہ آپ کی ٹانگوں کے پٹھوں کو مضبوط کیا جا سکے، خون کی گدش میں اضافہ ہو، اور ٹانگوں کے وینس تھرومبوسیس جیسی پیچیدگیوں کا خطرہ کم ہو پائے۔ ورزش کے لیوں، مثلاً چلنے کو، آہستہ آہستہ بڑھایا جا سکتا ہے۔



عکس 2: بائیک: لمب کی ورزش کے لیے

مالی پریشانی

میڈیکل سوشل ورکر معاونت فراہم کر سکتا ہے اگر ضرورت ہو۔ براہ مہربانی ہماری وارڈ نرس سے رابطہ کریں۔



عکس 4: فٹ اسپلینٹس

فٹ ڈریپ
اگر ایسا ہوتا ہے تو، آکوپیشنل تھریپسٹ آپ کے پاؤں کے گھماؤ کو برقرار رکھنے اور حالت کو مزید خراب ہونے سے روکنے کے لیے اسپلینٹ کا ایک جوڑا ڈیزائن کرے گا، عکس 4 دیکھیں۔

(1) ذاتی حفظان صحت

آپریشن سے پہلے اور بعد میں ذاتی حفظان صحت لازم ہے۔ روزانہ نہانا یا غسل کرنا آپ کی جلد کو صاف رکھتا ہے اور بیکٹیریا کی افزائش کو روکتا ہے۔ اگر آپ کو خدشہ ہو کہ نہانے یا غسل کرنے کے دوران زخم گیلا ہو جائے گا تو، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو گیلے تولیے سے صاف کریں اور پسپتال میں داخل ہونے کے دوران بہر روز اپنے خاندان کے افراد یا پسپتال کے صحت کے نگہداشت کنندہ معاونین کی مدد سے اپنے جسم سے قریبی ربط میں رہنے والے کپڑے تبدیل کریں۔ جب زخم ٹھیک ہو جائے گا اور اسٹیپلز پٹا دی جائیں گی تو، آپ معمول کے مطابق نہانے یا غسل کے قابل ہو جائیں گے۔ چیرے میں خالی جگہوں کو خشک کرنا یاد رکھیں اور چیرا خشک اور صاف رکھیں۔ اگر زخم سے پانی نکل رہا ہو یا آپ کو انفیکشن کا شبهہ ہو تو فوری طور پر معالجین سے رابطہ کریں۔

اگر آپ اپنی جلد کو خشک محسوس کرتے ہوں تو، آپ غسل کرنے یا نہانے کے بعد معتدل قسم کا مؤسچرائزنگ لوشن استعمال کر سکتے ہیں۔



اس کے علاوہ اپنے گھر کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیروں کو ختم کرنے اور انفیکشن سے بچاؤ کے لیے، اپنے گھر کو باقاعدگی سے صاف کریں (مثلاً ہفتے میں ایک مرتبہ)۔ اس کے علاوہ، آپ اپنے ٹوائلٹ اور

پانی کے ذرائع کو صاف کرنے کے لیے 1:99 بلیچ

استعمال کر سکتے ہیں۔

(2) تمباکو نوشی اور شراب نوشی ترک کریں

براح مہربانی تمباکو نوشی اور شراب نوشی نہ کریں۔ تمباکو نوشی آپ کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور کو سینے کے انفیکشن کی طرف لے جاتی ہے۔

شراب نوشی جگر کو مزید نقصان پہنچاتی ہے۔ براہ مہربانی شراب نوشی ترک کر دیں۔



(3) پُر ہجوم عوامی مقامات سے گریز کریں

جگر کی پیوند کاری کے بعد پہلے 3 ماہ میں، آپ کو پُر ہجوم عوامی مقامات جیسے سینماؤں، ریستورانوں اور ڈیپارٹمنٹل استوروں وغیرہ پر جاذے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر اس سے گریز نہیں کیا جا سکتا ہے تو، براہ مہربانی ماسک پہنیں اور عوامی مقامات پر ہاتھوں کی حفاظان صحت کا خیال رکھیں۔ ہم آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ جگر کی پیوند کاری کے بعد پہلے 3 ماہ میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو ماسک پہنیں۔

انفیکشن سے بچاؤ کے لیے جانوروں اور پرندوں کے ساتھ ریط سے گریز کریں۔

(4) ورزش اور سماجی سرگرمی

آپ کی صحت کی بحالی کی مدت کے دوران یا ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے پہلے چند ہفتوں کے دوران، آپ بغیر مشقت تھا ہوا محسوس کریں گے۔ براہ مہربانی مزید گھری سانس لینے کی ورزش کریں اور زیادہ آرام کریں۔ بعض اوقات آپ کو اپنے پورے جسم کے پٹھوں میں اور خاص طور پر ٹانگوں کے پٹھوں میں کمزوری محسوس ہو گی۔ یہ سرجری کے بعد ورزش کی کمی اور زستیرایڈ کے ضمنی اثر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ٹانگوں کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے، آپ کو ورزش کے لیول کو آپسٹہ آپسٹہ بڑھا دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ پیدل چلننا، سائیکل چلانا اور ایکسرسائز بائکس پر ورزش کرنا عمدہ چنانچہ ہے۔

اگر آپ ورزش کے دوران کسی قسم کی تکلیف محسوس کرتے ہوں، جیسا کہ سانس لینے میں دشواری، چکر آنا، سینے میں درد، اختلال قلب یا تیز دھڑکن تو، براہ مہربانی اپنی ورزش کو فوری طور پر بند کر دین اور آرام کریں۔ اگر صورت حال بہتر نہیں ہوتی ہے تو، آپ اپنے معالج سے مشورہ لے سکتے ہیں۔

ورزش آپ کے پٹھوں کی قوت کو بہتر بنا سکتی ہے، بعض ادویات کے مضر اثرات کو کم کر سکتی ہے اور قبض کو روک سکتی ہے۔ تاہم، جگر کی پیوند کاری کے بعد پہلے تین مہینوں میں، آپ کو بھاری وزن اٹھانے کے کام اور بھرپور ورزش سے گریز کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اسے آپسٹہ روی سے کر سکتے ہیں، بشمول سیٹ آپس، پیٹ کی ورزشیں اور تیراکی، جو پیٹ کے پٹھوں کو سخت کرنے، اور آپ کے پیٹ کو سپاٹ بنانے میں مدد کرتی ہیں۔ ہم آپ کو جلد از جلد اسکول واپس آنے یا کام پر جانے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن صحت کی بحالی کے عمل کے ہونے کے پہلے 3 مہینوں میں، براہ مہربانی معالجین سے مشورہ لیں اور فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی صحت کی حالت پر غور کریں۔



اگر آپ بیرون ملک کسی دورے پر جانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو، براہ مہربانی پہلے اپنی ٹرانسپلانت ٹیم کے معالجین سے مشورہ طلب کریں۔

(5) دانتوں کی دیکھ بھال

چگر کی پیوند کاری کے بعد، آپ کو منه کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے دانتوں کو صحتمند رکھنا چاہیے۔ اپنے دانتوں کو بہمیشہ برش کریں اور کھانے کے بعد منه سے کلی کر لیں۔ اگر آپ کو دانتوں کی دیکھ بھال یا دانتوں کا علاج کروانا پڑ جائے تو، براہ مہربانی دانتوں کے ڈاکٹر کو بتائیں کہ آپ جگر کی پیوند کاری کے مريض ہیں اور آپ اميونوسپریسنٹ پر ہیں۔



(6) خواتین مريضوں کے لیے، سرجری کے بعد ماہواری عارضی طور پر رک سکتی ہیں، مگر حاملہ ہونے کا موقع اب بھی موجود ہوتا ہے۔ مانع حمل طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو حاملہ ہونے کی کوشش کرنے سے قبل پیوند کاری کے بعد کم از کم ایک سال کے انتظار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

اميونوسپریسنٹ بعض قسم کی منه سے لی گئی مانع حمل گولیوں کے اثرات میں مداخلت کر سکتی ہے۔ اگر آپ منه کے ذریعے مانع حمل گولیاں لینا چاہیں تو، براہ مہربانی اپنے معالج سے بات کر لیں۔

(7) حمل

اگر آپ بچے پیدا کرنے کا فیصلہ کر لیں تو، براہ مہربانی ٹرانسپلانت ٹیم کے معالجین سے اپنے منصوبے پر بات کریں۔ اگرچہ بہت سی خواتین جگر کی پیوند کاری کے بعد مان اور بچے کے لیے کم سے کم خطرے کے ساتھ بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں، مگر جگر کی پیوندکاری کی حاملہ وصول کنندگان کی بغور نگرانی کی ضرورت پڑے گی۔

متعددی بیماریوں کے شکار مریضوں کے ساتھ ربط سے گریز کریں

اگر آپ کے دوست یا عزیز متعددی بیماریوں جیسا کہ انفلوئنزا اور نمونیا میں مبتلا ہوں، یا بالخصوص متعددی امراض جیسا کہ چکن پاکس، ہرپس یا ہیپاٹائلس کا شکار ہوں تو، براہ مہربانی ان کے ساتھ جسمانی ربط سے گریز کریں۔

اگر وہ گھر کے افراد ہوں تو، انہیں عمومی احتیاط کرنی چاہیے، مثلاً، علیحدہ دسترخوان اور برتن استعمال کریں، اور کھانسی وغیرہ کرتے ہوئے منه کو ڈھانپیں۔ علاوه ازین، آپ کے لیے ماسک پہننا اور ہاتھوں کی صفائی کا کثرت سے اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ تاہم، آپ کو اس کے باوجود انفیکشن ہونا اب بھی ممکن ہے۔

اگر آپ متاثر ہیں تو، آپ کو ٹرانسپلانت ٹیم کے ڈاکٹروں کو مطلع کرنا چاہیے، جو آپ کو مشورہ دیں گے اور ضروری علاج کا انتظام کریں گے۔

جگر کی پیوند کاری کے بعد فالو اپ دوروں سے متعلق رہنمائی

ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد، آپ لیور ٹرانسپلانت ٹیم کے مشورے کے مطابق مناسب علاج اور دیکھ بھال جاری رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ ڈسچارج ہونے کے بعد، آپ شیدول کے مطابق روئین فالو اپس کے لیے ایف/4، بلاک ایس، سپیشلسٹ کلینک، کوئین میری ہسپتال میں لیور ٹرانسپلانت کلینک جائیں گے۔ اگر آپ اپنے جسم میں واضح غیر معمولی پن محسوس کرتے ہیں تو، براہ مہربانی مزید انتظام کے لیے لیور ٹرانسپلانت ٹیم کو رپورٹ کریں۔

(1) لیور ٹرانسپلانت سنٹر ہائلائن

اگر آپ کو ڈسچارج کے بعد کسی قسم کے مسائل درپیش ہوں تو، براہ مہربانی کال کریں: ہائلائن: 2255 5800 (ریکارڈ فون انسٹال کریں) (سوموار تا جمعہ) ہم آپ کو دفتری اوقات میں کال بیک کرتے ہیں

نوٹس: اگر آپ کو بے چینی، جیسا کہ بخار، قے اور دست محسوس ہوں تو، براہ مہربانی جلد از جلد طبی معاونت طلب کریں۔

(2) شیدول کے مطابق فالو-اپس کے لیے واپس آئیں

عام طور پر، ڈسچارج کے بعد ابتدائی عرصہ میں فالو اپ دورے زیادہ کثرت سے ہوں گے۔ آپ کو فالو اپ کے لیے واپس آنا ضروری ہے، تاکہ ڈاکٹر آپ کو محفوظ اور مناسب طبی ہدایات دے پائے۔

عدم قبولیت اور انفیکشن جگر کی پیوند کاری کے مريضوں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے، لہذا آپ کو خون کے ٹیسٹ اور تشخیص سے گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ براہ مہربانی فالو اپ دورے کے دوران


امیونوسپریسنٹ مثلاً FK506 کی مطلوبہ خوراک ساتھ لانا یاد رکھیں، اور آؤٹ پیشنسٹ کلیننک سے خون نکالے جانے کے بعد اسے لیں (S4 کی اوپی ڈی کے بندوبست میں ادویات تقسیم نہیں کی جاتی ہیں)۔ ذیابیطس میلیٹس کے مريضوں کے لیے: اگر کوئی خاص ہدایت نہ ہو تو، براہ مہربانی کلینک جانے سے پہلے اپنا ناشته اور انسولین کا انجیکشن لگوا لیں۔ اگر ضروری ہو تو، آپ کو ذیابیطس کے مابر سے رجوع کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔

آپ کو اپنی ادویات اور لیور ٹرانسپلانت ٹیم کے ڈاکٹروں کی طرف سے تجویز کردہ خوراکوں کا واضح طور پر ریکارڈ کرنا چاہیے۔ کافی ادویات ہمارا رکھیں (الگے ط شدہ دورے تک کافی مقدار موجود ہو)۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے بغیر یا ادویات کی تبدیلی کی نشان دہی کرنے کے لیے کی گئی فون کال کے بغیر، کبھی بھی اپنی ادویات لینا بند نہ کریں یا انہیں تبدیل نہ کریں۔

(3) فالو اپ

عام طور پر، فالو اپ کے دن خون کا نتیجہ معالج کو ملاحظہ کرنے کے وقت جاری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاہم، خون کے تمام معائنوں کے نتائج کی ہمارے لیور ٹرانسپلانت کے سرجنوں کی طرف سے جانچ کی جائے گی، اگر ادویات یا خوراک میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو، ہمارا لیور ٹرانسپلانت کو آرڈینیٹر آپ سے رابطہ کرے گا اور اس کے مطابق آپ کو ہدایت درے گا۔ لہذا، اگر آپ پتہ یا ٹیلی فون نمبر تبدیل کرتے ہیں تو، براہ مہربانی S4 کے اوپی ڈی کاؤنٹر پر اپنا ریکارڈ جلد از جلد آپ ڈیٹ کریں۔

***** اختتام *****



1. جگر کی پیوندکاری کے بعد خون کا اخراج

پیوندکاری کے بعد پہلے 48 گھنٹوں میں خون بہنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ایسا پیٹ یا معدہ کی نالی میں ہو سکتا ہے۔

پیٹ کے اندر خون کا بھاؤ

سبب:

پیٹ کے اندر خون کا بھاؤ اکثر کوگولوپیتھی اور پورٹل ہائپر ٹینشن، اور سرجری کے دوران دشوار ہیموسٹیسیس کے بعد ہوا کرتا ہے۔ تاخیر سے خون کا اخراج شدید انفیکشن کے نتیجے کے باعث واقع ہو سکتا ہے جس سے ویسکولر اینسٹوموسس کی توز پھوڑ ہو سکتی ہے۔

علاج:

1. خون سے متعلقہ پرادرکٹس کی فراہمی کے ذریعے خون کے جماؤ کے مسئلے کی درستی کریں۔
2. اوپن سرجری کے ذریعے ہیموسٹیسیس۔

معدہ و آنت سے خون کا بھاؤ

سبب:

معدہ و آنت سے خون کا بھاؤ جو سڑیں السر، گیسٹرائیں، ڈودنیائیں، کولائیں یا آپریشن کے بعد سٹیرائیڈ کی زائد خوراک کے نتیجے میں ہوتا ہے، زیادہ تر پیوندکاری کے بعد پہلے 3 ماہ میں ہوتا ہے۔

علاج:

1. اینٹیسڈ کی آپریشن کے بعد کے ابتدائی عرصے میں سفارش کی جائے گی اور مریض کو ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔
 2. اینڈوسکوپک پیماؤسٹیس یا سرجری
 3. اگر خون بڑھے پیمائہ پر بھے تو، اینجیگرام اور ایمبلائزشن ضروری ہو جاتے ہیں۔
2. ویسکولر سٹینوسس یا تھرومبوسس

ہمیپاٹک آرٹری سٹینوسس یا تھرومبوسس

سبب:

سرجری یا اینسٹوموسس کے بعد تناؤ کے دوران آرٹیریل اینسٹوموٹک تکنیک سے متعلقہ۔

نشانیاں اور علامات:

جگر کا بے قاعدہ فعل، بدلتی ہوئی ذہنی کیفیت، ہائپوٹینشن، کوگولوپیٹھی، بخار، کپکپی، یرقان اور پیٹ درد۔

علاج:

- تھرومبوس یا شریان میں خون کی گردش میں رکاوٹ کی تشخیص کے لیے فوری سی اے ٹی سکین یا آرٹیریل اینجیوگرام۔ اگر تھرومبوس کی تشخیص ہو یا شبہ گزرا ہے تو:
1. تھرومبوس کے معانئے، ہٹانے کے لیے آپریشن اور اینسٹوموسس کی تشكیل نو۔
 2. اگر نشاندہی کی گئی ہو تو اینٹی تھرومبولاتٹک ایجنت کا انڈیلا جانا
 3. اگر علاج ناکام رہتا ہے تو، دوبارہ پیوندکاری درکار ہوگی۔

پورٹل وین سٹینوسس یا تھرومبوسس

سبب:

سرجری سے پہلے موجودہ پورٹل ہائپرٹینشن یا پورٹل وین تھرومبوس کے باعث ہو سکتا ہے۔

نشانیاں اور علامات:

جگر کے باقاعدہ فعل، خون جمنے کے وقت میں تاخیر، پورٹل ہائپرٹینشن کی نشانیاں اور پھیلی وریدوں سے خون کے بھاؤ کے ساتھ موجود ہو سکتی ہیں۔

علاج:

1. آپریشن کے بعد کے ابتدائی عرصہ میں تھرومبوسٹومی اور پورٹل وین اینسٹوموسس کا دوبارہ جائز۔

2. حالت کو درست کرنے کے لیے انجیوگرافی کے ذریع جگر کی رگ کے سکڑاؤ کی موجودگی میں چلد کے کھولے جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

3. اگر جگر کا فعل شدید طور پر خراب ہو جائے تو، دوبارہ سے پیوندکاری کی نشاندہی کر دی جاتی ہے۔

ویسکولر تھرومبوسس ایک سنگین پیچیدگی ہے۔ یہ جگر کے پیوند کے فعل کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اس کا فوری پته لگانا بہت ضروری ہے۔ فی الوقت، لیور ٹرانسپلانت سرجن جگر کی پیوندکاری کے پر مريض کے پیٹ کا الٹراساؤنڈ روزانہ کریں گے تاکہ اس مسئلے کا پہلے پته چل سکے۔

ذیل میں تصویر 1 ملاحظہ کریں۔



تصویر 1: ویسکولر الٹراساؤنڈ مشین

3. صفرا کی نالی کا سکڑاؤ یا رکاوٹ

سبب:

صفرا کی نالی کا سکڑاؤ پیوندکاری کے بعد ایک عام مسئلہ ہے۔ صفر کی نالی کے ملاب کی جگہ سکڑاؤ کی عام جگہ ہے۔ خطرے کے عوامل میں وائرس سے لگا انفیکشن، اسکیمک چوت، ایہ بی او غیر موافق، مسلسل عدم قبولیت اور صفرا کی نالی کا انفیکشن شامل ہیں۔

نشانیاں اور علامات:

بخار، کپکپی، یرقان، پیٹ درد اور شدید خارش

علاج:

1. اینڈوسکوپک ریٹروگریڈ کولنژیوبنکریاٹوگرافی (ERCP) کے ذریعے آنٹوں کے سنکن کا غبارے کی طرح پھیلاؤ۔

2. پرکیٹینس ٹرانشپیٹک بائیلیری ڈرینیج (PTBD)۔

3. اینسٹوموسیس سٹرکچر کو سرجری کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔

4. صفرا کا رساؤ

صفرا کی نالی کی انضمام شریان کی جگہ یا جگر کے چیرے والی جگہ سے رساؤ۔

سبب:

تکنیکی عنصر یا ہیپاٹک آرٹری کی تھرومبوسیس آرٹری

نشانیاں اور علامات:

بخار، پیٹ کا اپھارا اور درد، ڈرینج ٹیوب سے صفرہ کا اخراج

علاج:

1. اینٹی بائیوٹک کی نگرانی کریں۔
 2. اینڈوسکوپک ریٹروگریڈ کولینجیوپنکریاٹوگرافی (ERCP)۔
 3. اگر انضمام شریان سے رساؤ واقع ہوتا ہے تو، اینسٹوموسس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔
5. انفیکشن:

سبب:

پیوند کاری کروانے والے مريض کو آپريشن کے بعد بيکثيريل، فنگل يا وائل انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گرافٹ کو عدم قبولیت سے روکنے کے لیے دی جانے والی اميونوسپريسنٹ ادویات مريض کو انفیکشن کے زائد خطرے کا شکار کر دیتی ہیں۔ شدید انفیکشن سیپسیس، كثیر اعضاء کی ناکارگی کا باعث بنے گا، جس کے نتیجے میں موت واقع ہو سکتی ہے۔

نشانیاں اور علامات:

بخار (جسم کا درجہ حرارت 37.6°C یا 100°F ہو)، کپکپی اور میلائس، سانس لینے میں دقت، پیٹ کا شدید درد یا ڈس انٹینشن، شدید قے یا دست۔

علاج:

1. ذاتی حفظان صحت ضروري ہے۔
2. انفیکشن والی بیماری کے مريضوں کے ساتھ ربط سے گریز کریں۔
3. آپريشن کے دوران اور آپريشن کے بعد مانع مرض دافع انفیکشن ادویات دینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔

4. معالج سے رابطہ کریں اگر انفیکشن کی کوئی نشانی یا علامت نظر آئے۔

فی الوقت، جگر کی پیوندکاری پر مامور ٹیم اینٹی بائیوٹک، اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل ادویات تجویز کرے گی جو کہ جگر کی پیوندکاری کے بعد 3 ماہ کے لیے دی جائیں گے۔ گردھے کی خرابی کے مریض کے لیے، ہمارا معالج انفرادی طور پر ان ادویات میں روبدل کرے گا۔

جگر کی پیوندکاری کے بعد عدم قبولیت

اسباب:

جگر کی پیوندکاری کے بعد، آپ کے جسم کا مدافعتی نظام فعال ہو جائے گا تاکہ آپ کے نئے جگر کے خلاف مذاہمت کر سکے جس سے عدم قبولیت ہو سکتی ہے۔ امیونوسپریسینٹ ادویات کو ضرورت پڑ جاتی ہے تاکہ اس عدم قبولیت سے بچا جا سکے۔

نشانیاں اور علامات:

ابتدائی عدم قبولیت کے حوالے سے، اکثر کی کوئی نشانیاں یا علامات نہیں ہوتی ہیں، مگر تاخیر سے عدم قبولیت پر، ان میں درج ذیل وقوع پذیر ہو سکتی ہیں:

1. آنکھ اور جلد کا زرد پڑ جانا
2. گھرے رنگ کا پیشاب آنا
3. بخار
4. جگر کے مقام پر درد

علاج:

1. امیونوسپریسینٹس جو کہ عدم قبولیت جیسا کہ ٹیکرولیمس (FK506)، مائیکوفینولیٹ میفوئیل (MMF) وغیرہ سے بچاتے ہوں۔
2. مریض کو ڈکٹر کے نسخے کے مطابق دواليں کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔

اگر درج ذیل علامات وقوع پذیر ہوتی ہیں تو، براہ مہربانی ہمارے لیور ٹرانسپلانت سنٹر سے جلد از جلد رابطہ کریں:

1. 24 گھنٹوں سے زائد دست ہبوں

2. متلى یا ق جو کہ آپ کو ادویات لینے سے روک دے

پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ ہمارے شیدول کے مطابق فالو اپ کروائے ہیں تو، آپ کے خون کا نتیجہ جو فالو اپ کے دن لیا گیا تھا، اس کی بیماری ٹیم کے معالجین کے ذریعے جانچ کی جائے گی۔ اگر کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔

***** اختتام *****

کوئین میری پاسپل	پمفلٹ کا عنوان اور شعبہ جاتی کوڈ
ملکیت	QMHSrgery-52
آخری جائزہ/نظر ثانی	مئی/2021
منظوری	HKWC انفارمیشن پمفلٹ ورکنگ گروپ
تقسیم	جیسا کہ درخواست کی گئی